

Proctinum[®]

Wyrób medyczny



- Przynosi ulgę w objawach związanych z hemoroidami oraz podrażnieniami okolic odbytu
- Pomaga złagodzić ból, swędzenie oraz pieczenie

Mechanizm działania

PROCTINUM jest delikatną i lekką emulsją hydrofilową, która zapewnia ochronę podrażnionym obszarom. Jest to specyficzny środek wspomagający łagodzenie objawów towarzyszących hemoroidom wewnętrznym i zewnętrznym oraz podrażnieniu odbytu.

Preparat tworzy fizyczną barierę, która chroni tkanki okolicy odbytu, minimalizując możliwość kolonizacji przez bakterie oraz kontaktu z zanieczyszczeniami środowiskowymi, które mogą zaostrzyć stan hemoroidów.

Dzięki swojej formule przyczynia się do fizjologicznej odbudowy okolic odbytu. **PROCTINUM** wykazuje działanie ochronne, nawilżające i odświeżające.

PROCTINUM ma właściwości zmiękczające, które pomagają zapobiegać podrażnieniom i dyskomfortowi w okolicy odbytu – przynosi to ulgę w bólu, pieczeniu, swędzeniu i innych powiązanych dolegliwościach.

Jego zastosowanie pozostawia leczony obszar miękki i nawilżony, co pozwala uniknąć ponownego podrażnienia i pęknięcia skóry. Działanie nawilżające ułatwia wypróżnianie, minimalizując w ten sposób urazy i uczucie bólu związane z wypróżnianiem.

Wspiera także fizjologiczny proces naprawy.

Działanie produktu nie zostało ocenione w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego preparatu.

PROCTINUM przynosi ulgę:

- w przypadku występowania hemoroidów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych
- w przypadku dyskomfortu okolic odbytu, takich jak swędzenie i pieczenie
- w przypadku podatności na podrażnienia okolic odbytu

Sposób użycia

PROCTINUM należy aplikować do kanału odbytu oraz na okolicę odbytu w celu złagodzenia objawów związanych z występowaniem hemoroidów i podrażnień odbytu.

• APLIKACJA ZEWNĘTRZNA

W przypadku dyskomfortu zewnętrznych okolic odbytu, **PROCTINUM** można aplikować przy użyciu palca, delikatnie wmasowując. Produkt może być również stosowany przed wypróżnieniem w celu ułatwienia tego procesu (należy zawsze dokładnie umyć okolice, na które stosuje się produkt oraz ręce przed i po zastosowaniu produktu).

• APLIKACJA WEWNĘTRZNA

Do wyrobu **PROCTINUM** dołączony jest specjalny aplikator, który można przykręcić do tubki. Ten specjalny aplikator pozwala na aplikację preparatu do kanału odbytu.

Przed zastosowaniem wyrobu należy zawsze dokładnie umyć okolice, na które stosuje się produkt oraz ręce przed i po zastosowaniu produktu.

1. Przed pierwszym użyciem produktu należy odkręcić nakrętkę tubki i użyć jej zewnętrznej strony, aby przebić zamknięcie tubki.
2. Nakręcić aplikator na otwór tubki i delikatnie umieścić w odbycie (można również nałożyć cienką warstwę produktu na krawędź aplikatora, aby ułatwić jego wprowadzenie do odbytu).
3. Ścisnąć tubkę, aby wycisnąć z niej wystarczającą ilość emulsji.
4. Po użyciu dokładnie wyczyścić aplikator mokrym ręcznikiem papierowym i pozostawić do wyschnięcia.
5. Na koniec nałożyć na aplikator nasadkę ochronną.

Aplikacja

Produkt stosować w razie potrzeby, maksymalnie 3-4 razy dziennie.

Aby zapobiec podrażnieniu odbytu i pękaniu skóry, można stosować **PROCTINUM** raz dziennie.

Składniki

Woda, olej roślinny, parafina ciekła, petrolatum, CETEARETH-20, alkohol cetearylowy, uwodorniony hydrolyzolat skrobi, olej ze słodkich migdałów (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), alkohol izostearylowy, PEG-75 stearate, stearynian glicerolu, glikol propylenowy, dimetikon, PEG-8 stearate, laurynian izodecyłu, ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego (Aesculus Hippocastanum Seed Extract), sól dwupotasowa kwasu glicyryzynowego, alkohol benzylowy, fenoksyetanol, alkohol oleiowy, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella Asiatica Extract), uwodorniona lecytyna, sorbinian potasu, glicyrynian stearylu, maltodekstryna, alantoina, parafina, sól dwusodowa kwasu wersenowego, ekstrakt z owoców pieprzu syczańskiego (Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract), kwas mlekowy, glikol butylenowy, LAURETH-3, hydroksyetyloceluloza, tokoferol, ester cetylowy Acetyl Dipeptide-1.

Działania niepożądane

Nie są znane żadne działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu PROCTINUM, jednakże:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- W przypadku wątpliwości należy nałożyć niewielką ilość produktu na wewnętrzną stronę przedramienia. Jeżeli pojawią się zaczerwienienia i drażniące plamy, nie zaleca się stosowania produktu.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane lub objawy utrzymują się, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku indywidualnego, nie należy go udostępniać innym.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania światła, w temperaturze pokojowej (od 5°C do 30°C).
- Nie stosować jeśli tubka jest uszkodzona.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie spożywać.
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oka należy: dokładnie przepłukać oko wodą oraz ewentualnie zasięgnąć porady lekarza.
- Po zastosowaniu ostrożnie wyczyścić aplikator, pozostawić do wyschnięcia i zabezpieczyć nasadką.
- Jeśli objawy utrzymują się po 30 dniach stosowania preparatu, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Działanie produktu nie zostało ocenione w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego preparatu.

Uwaga

W przypadku utrzymujących się bądź nawracających dolegliwości, należy skonsultować się z lekarzem. Również w przypadku pogorszenia lub pojawienia się stanu zapalnego, reakcji alergicznej lub infekcji, należy skontaktować się z lekarzem.

Możliwe interakcje

Obecnie nie są znane interakcje między produktem a lekami lub innymi wyrobami medycznymi. Jednak w przypadku jednoczesnego, ciągłego i długotrwałego stosowania leków, w szczególności leków przeciwzakrzepowych, przeciwplatek lub uspokajających, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu.

Opakowanie: tubka 30 ml z aplikatorem wielokrotnego użytku



Wytwórca:
Biokosmes s.r.l. – socio unico
Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ITALY

Wyprodukowano we Włoszech

Dystrybutor:
Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji instrukcji użycia: 01.2020

SYMBOL	OZNACZENIE SYMBOLI
	Znak CE wydany przez jednostkę notyfikowaną 0477
	Wytwórca
	Zajrzyj do instrukcji użycia
	Temperatura przechowywania od 5°C do 30°C
	Termin ważności
	Numer serii