



SKALA 1:1



kod kreskowy



Podgląd



SKALA 1:1

148 mm

43 mm

45 mm

45 mm

43 mm

176 mm

Składniki: maślan sodu, substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wiążąca: metyloceluloza, barwnik: węglan wapnia, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, składnik otoczki: talk, emulgator: glikol polietylenowy.

Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane na blistrach i kartoniku.

Ważne informacje:
Jest to produkt niekompletny pod względem odżywczym. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie produktu. Stosować pod nadzorem lekarza.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent:
Natur Produkt Zdovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Wartość odżywcza	100 g	1 tabletką	2 tabletki
Wartość energetyczna	1976 kJ/472 kcal	20 kJ/5 kcal	40 kJ/9 kcal
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone	48 g 48 g	0,48 g 0,48 g	0,96 g 0,96 g
Węglowodany - w tym cukry	- -	- -	- -
Błonnik	25 g	0,25 g	0,50 g
Białko	-	-	-
Sól	30,0 g	0,3 g	0,6 g
Maślan sodu - w tym kwas masłowy	60,0 g 48,0 g	600 mg 480 mg	1200 mg 960 mg

1. Banasiewicz T, Borycka-Kiciak K, Dobrowolska-Zachwieja A, i wsp. Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5: 329-334.
2. Kuczyńska B, Wasilewska A, Biczysko M i wsp. Krótkolącuchowe kwasy tłuszczowe – mechanizmy działania, potencjalne zastosowanie kliniczne oraz zalecenia dietetyczne. Nowiny Lek 2011; 80: 299-304.
3. Banasiewicz T, Kaczmarek E, Maik J i wsp. Jakość życia i objawy kliniczne u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego, leczonych uzupełniająco maślanem sodu. Gastroenterol Prakt 2011; 3: 45-53.
4. Waśko-Czopnik D. Znaczenie maślanu sodu w leczeniu chorób czynnościowych i zapalnych jelit. Gastroenterol Prakt 2018; 2: 45-52.
5. Skrzydło-Radomańska B, Radwan P. Zastosowanie preparatów kwasu masłowego w gastroenterologii. Gastroenterol Prakt 2013; 4: 34-41.
6. Pietrzak A, Skrzydło-Radomańska B, Mulak A i wsp. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego. Gastroenterol Rev 2018; 13: 1-29.
7. Z. Tian et al. The propionic acid and butyric acid in serum but not in feces are increased in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. BMC Gastroenterology 2020, <https://doi.org/10.1186/s.12876-020-01212-3>
8. Ocena dostępna w: Skrócony raport z badań dostępności farmaceutycznej maślanu sodu in vitro

