

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji używania, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Ten wyrób medyczny jest dostępny bez recepty. Jednakże, aby osiągnąć najlepszy możliwy efekt leczenia, multiGastro wzdęcia musi być on stosowany zgodnie z zaleceniami.

multi wyrób
medyczny
Gastro

wzdęcia

WSKAZANIA:

Wyrób medyczny multiGastro wzdęcia stosuje się przy :

- dolegliwościach związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w jelitach i uczuciem pełności w jamie brzusznej
- oraz wspomagająco:**
- w leczeniu bólu związanego z czynnościową chorobą jelit m.in. zespołem jelita drażliwego (IBS) objawiającą się nadmiernym gromadzeniem się gazów,
 - pomocniczo przed badaniami diagnostycznymi (obrazowymi): ultrasonografią, radiografią i endoskopią jamy brzusznej w celu usunięcia nadmiaru gazów przed badaniami.

SPOSÓB PODANIA:

Stosować tylko doustnie. Tabletki żuć powoli. Nie połykać. Wyrób **multiGastro wzdęcia** należy stosować po posiłku.

DAWKOWANIE I CZAS STOSOWANIA

Jak często i w jakiej ilości należy stosować **multiGastro wzdęcia**?

W przypadku wzdęć:

- Dzieci w wieku 6-14 lat
1 tabletką do żucia, 3-4 razy dziennie.
- Młodzież od 14 lat i dorośli
1-2 tabletki do żucia, 3-4 razy dziennie.

Jeżeli po 7 dniach stosowania wyrobu medycznego **multiGastro wzdęcia** silne wzdęcia nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku przygotowań do badań obrazowych:

Pierwsza dawka (1 dzień przed badaniem):

- Dzieci w wieku 6 lat i starsze oraz dorośli:
1 tabletką do żucia, 3-4 razy na dobę.

Dawka uzupełniająca (w dniu badania):

- Dzieci w wieku 6 lat i starsze oraz dorośli:
1 tabletką do żucia na 2 godziny przed badaniem.

U dzieci od 6 roku życia i starszych stosować tylko pod nadzorem osoby **dorościej**.

Wyrób **multiGastro wzdęcia** nie wywołuje tzw. "efektu przyzwyczajania".

Substancja czynna preparatu **multiGastro wzdęcia** nie jest wchłaniana, lecz wydalana w całości w niezmienionej postaci z kałem.

SKŁAD:

1 tabletką zawiera.

Substancja aktywna: *simetikon 180 mg*

Inne składniki: izomalt, krzemian wapnia, celuloza mikrokryształiczna, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, aromaty (olejek z mięty pieprzowej, olejek z kopru włoskiego, olejek z czarnuszki), sukraloza.

POSTAĆ I ZAWARTOŚĆ:

20 tabletek do żucia.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. **Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik, w tym olejek z kopru włoskiego.**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I UWAGI:

Stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią:

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie u dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia:

Należy zawsze skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- przedłużających się i niejasnych dolegliwości brzusznych,
- wzdęć i uczucia pełności przy pustym żołądku,
- zmiany konsystencji stolca,
- bardzo bolesnych wzdęć,
- gdy występują inne dolegliwości.

INTERAKCJE:

W przypadku przyjmowania innych leków m.in. lewotyroksyny i karbamazepiny wyrób medyczny **multiGastro wzdęcia** może wpływać na ich działanie.

Zaleca się, aby nie stosować **multiGastro wzdęcia** jednocześnie z innymi lekami, ale przyjmować je w odstępie co najmniej 1-2 godzin, aby nie zmniejszać ich skuteczności.

EFEKTY UBOCZNE:

Jak w przypadku stosowania każdego produktu, mogą wystąpić reakcje alergiczne. Objawami tego mogą być: zaczerwienienie i swędzenie skóry, katar, obrzęk błon śluzowych, swędzenie i zaczerwienienie oczu, zwężenie dróg oddechowych (duszności, astma). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej należy natychmiast poinformować lekarza i przerwać stosowanie produktu.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione powyżej, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w temperaturze od +15°C do +25 °C w miejscu suchym. Chronić przed wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu medycznego **multiGastro wzdęcia** po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce, można je zgłaszać bezpośrednio producentowi: phv@zdrovit.pl lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgłoszenia incydentu medycznego dokonuje się na formularzu zgłoszenia incydentu medycznego, który przesyła się Prezesowi Urzędu pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

Instrukcja używania i oznakowania wyrobu medycznego spełnia wymogi dotyczące informacji przekazywanych przez producenta wraz z wyrobem, określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Wyrób medyczny  2274

Data utworzenia instrukcji używania: 20.09.2024 r.



Producent:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31

01-918 Warszawa, Polska

OZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU:

Data, po której nie wolno używać wyrobu medycznego.



Numer serii producenta, który umożliwia zidentyfikowanie serii lub partii.



Zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi wyrobów medycznych.



Granice temperatury, na działanie której można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.



Numer katalogowy wyrobu medycznego, który umożliwia zidentyfikowanie wyrobu medycznego.



Producent.



Oznacza, że produkt jest wyrobem medycznym.



Sprawdź ważne informacje w instrukcji używania takie jak ostrzeżenia i środki ostrożności, które z różnych powodów nie mogą zostać umieszczone na samym wyrobie medycznym.



Zapoznaj się z instrukcją używania.



Nośnik, który zawiera informacje dotyczące niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu.



Nie należy używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte.



Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią.



 012-MUGW